

FUNGI CROATICI.

(a Dr. Ed. Baudyš collecti.)

— Dr. Rich. Picbauer. —

(Prag, 6.-III-1928.)

Mense Aprili et Majo 1925. Dr. Ed. Baudyš Crikvenicae Croatiae litorali moratus est. Fungos, quos in hac regione legit, mihi ad determinandum dedit. Nonnullusque species (Autobasidiomycetes) Alberto Pilát, assistenti instituti botanici universitatis bohemicae Pragae, misit, qui eos determinavit atque in commentariis pragensibus Mykologia II, pg. 93—95, capitulum de his inventis (Několik hub z okolí Crikvenice v Jugoslavii) scripsit. Integritatis causa nomino hic etiam has species atque determinationem Piláti adnoto. Species novas, jam prius in Actis societatis scientiarum naturalium moravicae publicatas interum integritatis causa nomino ac etiam descriptiones earum. Documenta in herbario Baudyši asservantur.

Myxomycetes.

Trichamphora pezizoidea Jugh. Ad thallum Auriculariae mesenteriae ad Krčinam apud Brilic et ad portum Marnestri.

Phycomycetes.

Synchytrium Stellariae Fuck. Ad folia Stellariae mediae Cyr. ad St. Jelenam apud Crikvenicam.

Albugo candida U. Kunze ad folia Arabidis hirsutae Scop. supra Therapiam Crikvenicae.

Peronospora aestivalis Gäm. Ad folia Medicaginis falcatae ad Semičeviči a Crikvenica ad septentriones versus.

Ad folia Medicaginis Pironae Vis. infra Therapiam Crikvenicae.

Peronospora Herniariae D. B. Ad folia Herniariae glabrae ad Dragam prope Crikvenicam.

Peronospora Ficariae Tul. Ad folia Ranunculi velutini infra Sopalj Belgradski a Crikvenica ad septentriones versus.

Peronospora Sherardiae Fuck. Ad folia Sherardiae arvensis in convalli Dubračinae fluminis apud Crikvenicam.

Peronospora calotheca D. B. Ad folia Asperulae cynanchicae in insula Krk in declivibus a Alexandrovo ad orientem versus.

Peronospora verna Gäum. ad folia Veronicae arvensis ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicæ.

Basidiomycetes.

Hemibasidii (Ustilaginales).

Ustilago violacea Tul. In antheris Dianthi tergestini (Rchb.) Kern. in declivi infra Therapiam Crikvenicæ.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn. In oogoniis Caricis humilis in declivi a Crikvenica ad orientem versus.

Schizonella melanogramma (D. C.) Schroet. In foliis Caricis piluliferae infra Therapiam et in declivitate infra Sopaljski a Crikvenica ad septentriones versus.

Entyloma fuscum Schroet. In foliis Glaucii flavi ad litus maris apud Alexandrovo in insula Krk.

Tuburcinia Hellebori viridis (D. C.) Liro. In foliis Hellebori dumetorum in silva in insula Krk inter meridiem et occasum solis ab oppido Vrnik.

Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet. in foliis Ranunculi calthaefolii Rchb. ad Marusići prope Crikvenicam.

Uredinales.

Melampsora Euphorbiae Gerardiana W. Müller. In foliis Euphorbiae falcatae infra Therapiam Crikvenicæ.

Melampsora Euphorbiae (Schub.) Müll. In foliis Euphorbiae exiguae in litore maris Adriatici ad Crikvenicam, ad portum St. Jelena, in convalli Dubračinae fluminis.

Coleosporium sp. In acubus Pini nigrae in convalli Dubračinae fluminis infra Badanj a Crikvenica ad septentriones versus.

Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart. Ad ramos Juniperi Oxycedri ad Crikvenicam.

Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) Wint. Ad ramos Juniperi Oxycedri in silva supra liberorum coloniam Crikvenicæ et infra Zelengaj.

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) Rees. Aecidia in foliis Crataegi monogyna ad St. Jelenam et in declivi Drenin.

Gymnosporangium confusum Plowr. Aecidia in foliis Crataegi Oxyacanthae ad Vrbnik in insula Krk.

Uromyces Limonii D. C. In foliis Staticis angustifoliae Tausch. in insula Košljun et in litore maris in insula Krk Alexandrovo versus.

Uromyces Scleropoae Baudyš et Picbauer sp. n.

Maculis amphigenis, luteo-brunneis, soris sparsis ac minutis. Uredosporis globosis vel subglobosis, $19 - 23 \times 26 \mu$ diam., e hyalino flavidé-brunneolis, subtiliter echinulatis, episporio $1,7 - 2 \mu$ crasso praeditis, teleutosporis globosis vel subglobosis, laevibus, luteo-brunneis, $22 \times 24 \mu$ diam., poris germinationis 3—4 instructis.

Habitat in foliis culmisque Scleropoae rigidae (L.) Gris. ad hortos urbanos Crikvenicae. 18. V. 1925. Baudyš legit.

Descriptionem inopia materiae incompletam solum dare possum.

Uromyces Poae Rbh. Aecidia in foliis Ficariae vernaе ad Košulandiči.

Aecidia in foliis Ranunculi velutini ad Semicjeviči.

Uromyces Behenis D. C. In foliis Silenis inflatae ad Dragam et ad St. Jelenam.

Uromyces Geranii Otth. In foliis Geranii columbinii ad Therapiam Crikvenicae.

Uromyces Magnusii Klebahn. In foliis Medicaginis minimaе in viridariis et ad Therapiam Crikvenicae atque ad Šuperam.

In foliis Medicaginis carstiensis Wulf. ad Šuperam.

Uromyces striatus Schroet. In foliis Medicaginis orbicularis (L.) All. locis gramineis infra Therapiam et ad viridaria urbana Crikvenicae.

Uromyces Trigonellae Patouwill. In foliis Trigonellae monspeliacae ad viridaria urbana et infra Therapiam Crikvenicae.

Uromyces Ononidis Passer. In foliis Ononidis Columnae All. ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Uromyces Scillarum Grev. In foliis Muscaridis Kernerii in declivitatibus a Alexandrovo ad orientem spectantibus in insula Krk.

Puccinia Crepidis Schroet. In foliis *Crepidis capillaris* Wallr. in declivitate infra Therapiam Crikvenicae.

Puccinia Menthae Pers. In foliis *Saturejae vulgaris* et *Clinopodii vulgaris* infra Therapiam Crikvenicae.

Puccinia bromina Eriks. In foliis *Bromi mollis* ad viridaria urbana Crikvenicae.

In foliis *Bromi sterilis* Crikvenicae.

In foliis *Bromi maritimi* infra Therapiam Crikvenicae.

Puccinia glumarum (Schmidt) Eriks. et Henn. In foliis *Hordei maritimi* ad viridaria urbana Crikvenicae.

Puccinia triticina Eriks. In foliis *Agropyri litoralis* in litore maris ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Puccinia Agropyri Ell. et Ev. Aecidia in foliis *Clematidis Vitalbae* Crikvenicae et in litore maris infra St. Jelenam.

Puccinia Baryi Berk. et Br. In foliis *Brachypodii silvatici* in convalli Dubračinae fluminis.

Puccinia coronata Corda. In foliis *Avenae barbatae* Brot. in litore maris infra Therapiam Crikvenicae.

Puccinia Baudyšii Picbauer sp. n.

Soris uredosporarum parvis ac sparsis, hypophyllis vel in vaginis, tectis, epidermide rufa apparentibus. Uredosporis globosis, 19 — 23 μ diam., episporio tenui ca. 1,5 μ crasso praeditis ac tenuiter echinulatis.

Teleutosporis atrobrunneis, minutis vel lineatim protractis ac lineatim dispositis, epidermide tectis (denique liberis?) ac paraphysibus clavariaeformibus cinctis; teleutosporis clavatis, apice rotundatis, rarius truncatis, ibique ca. 3,6 μ incrassatis, ad septum constrictis, basi attenuatis, fusco-luteolis, eorumque cellula superiore saturatiore (usque castaneo-lutea), inferiore cellula dilutiore (usque luteole hyalina), 42 — 57 μ longis ac 15 — 19,2 μ latis. Mesosporis crebris, obovatis, basim attenuatis, ca. 36 μ longis ac 14 μ latis. Paraphysibus hyalinis, vel fusciscentibus.

Habitat ad folia vaginasque *Psiluri aristati* (L.) Duval-Joure in declivitate infra Therapiam Crikvenicae. 2. V. 1925. lecta.

Species *Puccinia Narduri* Gz. Fragoso quae in montibus Hispaniae in Narduro Lachenalii advenit, propinquis, a qua latitudine teleutosporarum eorumque episporio apice minus incrassato differt. Mesosporis minoribus ac paraphysibus clavariaeformibus etiam differe videtur.

Puccinia Festucae Plowr. In foliis Festucae rubrae ad St. Jelenam.

Puccinia Pseudomyuri Kleb. In foliis Festucae Myuri ad viridaria urbana Crikvenicæ.

Puccinia Sesleriae Reichb. Ad folia Sesleriae autumnalis in declivitate calcareo infra Sopaljsko.

Puccinia Cirsii lanceolati Schroet. Ad folia Cirsii lanceolati ad Therapiam Crikvenicæ.

Puccinia Allii Rud. In foliis Allii Scorodoprasii infra Therapiam Crikvenicæ.

In foliis Allii saxatilis in litore maris ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicæ.

Puccinia chondrillina Bub. et Syd. In foliis caulibusque Chondrillae juncaceae in convalli Dubračinae fluminis a Badanje usque ad Crikvenicam.

Puccinia Pilosellidearum Probst. In foliis Hieracii Pilosellae ad Dragam, in declivitate infra Sopaljsko et ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicæ.

Puccinia Centaureae D. C. In foliis Centaureae diffusae Lam. ad portum St. Jelenae.

Puccinia Vincae D. C. In foliis Vincae majoris ad vilam Mojmiles Crikvenicæ.

Puccinia Malvacearum Mont. In foliis Althaeae officinalis Crikvenicæ.

In foliis Malvae silvestris in declivitate Kamenište ab oppido Krk ad orientem versus.

In foliis Malvae rotundifoliae ad St. Jelenam.

In foliis Malvae nicaeensis All. in insula Krk inter Vrbnik oppidum et Alexandrovo, locis oppido Krk propinquis et inter Krk et Šilem.

Aecidium Inulae crithmoidis Jaap. In foliis Inulae crithmoidis ad litora maris in sinu Alexandrovo oppidum versus in insula Krk.

Auriculariales.

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. Ad caudices quercuum (Querus pubescens) ad Kačjak prope Crikvenicam.

Autobasidiomycetes.

Aleurodiscus acerinus Pers. Ad ramos putridos Aceris campestris ad Vinodol. Determ. ac. publ. A. Pilát.

Aleurodiscus roseus (Pers.) v. Höhn. et Litsch. Ad ramos putrescentes *Aceris monspessulanii*, *Quercus pubescens*, *Carpini duinensis* ad Crikvenicam.

Ad caudices putrescentes *Quercus pubescens* ad Šuperam. Determ. ac publ. A. Pilát.

Peniophora gigantea Massee. Ad caudices putrescentes *Pini nigrae* supra coloniam liberorum bohemicam Crikvenicæ. Determ. ac publ. A. Pilát.

Peniophora corticalis (Bull.) Cooke. Ad ramos putrescentes *Quercus Ilicis* procul Crikvenica. Determ. et publ. A. Pilát.

Peniophora caesia Bres. Ad ramos sicclos et putrescentes *Erythrina japonicae* in viridariis urbanis infra Therapiam Crikvenicæ.

Ad ramos putrescentes *Viticis Agni casti* ad Crikvenicam.

Ad ramos emortuos *Syringae chinensis* Crikvenicæ.

Ad caudicem putrescentem *Carpini duinensis* ad Crikvenicam.

Ad caudicem lignumque *Ulmie effusae* in viridariis urbanis Crikvenicæ.

Ad ramos emortuos *Rhus typhinae* ad Šuperam. Determ. et publ. A. Pilát.

Gloeopeniophora incarnata v. Höhn. et Litsch. Ad *Rhum Continum* in litore maris ad Crikvenicam.

f. *Platani orientalis* Sacc. Ad *Quercum pubescens* infra Therapiam Crikvenicæ et ad *Carpinum Betulum* in *convallia Dubracinae* fluminis. Determ. ac publ. A. Pilát.

Stereum hirsutum Wild. Ad caudices putrescentes *Quercus pubescens* ad Therapiam Crikvenicæ, ad Crikvenicam, in litore maris pr. St. Jelenam. Determ. et publ. A. Pilát.

Polyporus hirsutus Wulf. Ad caudicem putrescentem *quercus* inter St. Barbaram et St. Sebastianum ad Crikvenicam. Determ. et publ. A. Pilát.

Polyporus adustus Wulf. Ad ramos putrescentes *Rhus typhinae* ad Šuperam. Determ. et publ. A. Pilát.

Daedalea quercina L. Ad caudices putrescentes *quercuum* ad Crikvenicam. Determ. ac publ. A. Pilát.

Panus stipticus Bull. Ad caudices putrescentes *Quercus pubescens* ad Crikvenicam. Determ. ac publ. A. Pilát.

Panus rufis Fr. Ad caudicem quercus inter St. Barbaram et St. Sebastianum.

Ad caudicem *Quercus pubescens* ad viridaria urbana Crikvenicae. Determ. ac publ. A. Pilát.

Schizophyllum alneum (L.) Schroet. Ad *Oleam europaeam* Crikvenicae.

Mycena galericulata Scop. Ad caudices putridos arborum procul Crikvenicae. Determ. et publ. A. Pilát.

Dermocybe cinnamomea L. Ad Crikvenicam. Determ. ac publ. A. Pilát.

Clathrus cancellatus Tournef. In nemore olearum proprius coloniam liberorum bohemicam inter St. Jelenam et Crikvenicam ineunte majo. Communicavit mecum Dr. Baudyš, qui fungum hunc. Jahr. Klika Pragae misisse dixit. Ego ipse non vidi.

Astraeus stellatus (Scop.) Fisch. Infra Therapiam Crikvenicae.

Cyphella villosa (Pers.) Karst. ad caules *Clematidis Vitalbae* emortuos infra Therapiam Crikvenicae.

Ascomycetes.

Taphrina Rostrupiana (Sadeb.) Giesenhag. In fructibus *Pruni spinosa* inter Vrbnik et Alexandrovo in insula Krk frequens; omnibus locis in sepibus a Grižan usque ad Bribir; Kamnište a Krk ad orientem versus.

Taphrina Insitiae (Sad.) Johans. Ad folia *Pruni domesticae* ad coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Taphrina deformans (Berk.) Tul. Ad folia *Pruni persicae* ad Žoričiči prope Crikvenicam.

Apiosporium salicinum (Pers.) Kunze in statu conidiali ad folia *Rhamni alaterni* L. infra Therapiam Crikvenicae.

Cucurbitaria Coluteae Rbh. Ad ramos *Coluteae arborecentis* ad Ljubičić a Crikvenica ad septentriones versus.

Strickeria (Theichospora) Dorycnii Baudyš et Picbauer sp. n.

Peritheciis nigris, immersis, ca. 375 μ diam., ostiolo praeditis, contextu parenchymatico, ostiolo praeditis ac prominulis.

Ascis cylindraceis, 8 sporis, 97 — 115 μ longis ac 11,5 μ latis.

Sporidiis monostichis, interdum in superiore parte distichis, oblique positis, oblonge ovoideis, 5 — 6 transverse septatis, ple-

rumque 6 septatis, rarius 7 septatis, ad septa leniter constrictis, sordide luteis, veteribus castaneo-brunneis, in longitudinem plurimum imperfecte uniseptatis, saepe in 1 — 2 — 3 — 4 loculis, septo plus minusve oblique posito, 17 — 23 μ longis ac 7 — 7,8 μ latis.

Habitat ad ramulos *Dorycnii germanici* Rouy in declivitate Drenin ad Crikvenicam.

Lophiotrema Helichrysi Fabre ad caules *Helichrysi italicici* (Roth.) Guss. ad Šuperam p. Crikvenicam.

Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schroet. ad folia *Rhus Cotini* supra coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Mycosphaerella Baudyšana Picbauer in Fungi novi vel minus cogniti, pars II, 1925. In foliis emortuis *Inulae crithmoidis* in litore maris Adriatici in insula Košljun.

Peritheciis foliis emortuis, fuscatisque copiose insidentibus, nigris, globosis, supra conice attenuatis, papillatis, 90 — 100 μ diam.

Ascis media parte ventriformiter dilatatis, supra attenuatis, infima parte in stipitem attenuatis, 48 — 60 μ longis, 12 — 14 μ latis.

Sporis infima parte ascorum binis, parte superiore singulis, fusiformibus, utrinque rotundatis, uniseptatis, ad septum aperte constrictis, hyalinis, 15 — 16 μ longis, 5 μ latis.

Mycosphaerella familiaris Auerw. in foliis *Quercus pubescens* in litore maris Adriatici ad Crikvenicam.

• *Metaspshaeria Arabidis* Johans. ad folia *Arabidis Scopoliana* ad Vinodol prope Crikvenicam. Fungum hunc hoc anno etiam in Moravia ad Brno ad folia languida *Arabidis sagittatae* invenimus. Certe phytogeographice res interessans, nam primum a Johanson e Grönland descripta. Puto potius fungum hunc praetermissam esse.

Leptosphaeria Rusci (Fr.) Sacc. ad caules *Rusci aculeati* L. ad Šuperam prope Crikvenicam.

Leptosphaeria nigrans (Desm.) Ces. et de Not. Ad culmos *Dactylidis hispanicae* Roth. ad Crikvenicam.

Leptosphaeria cucurbitarioides H. Fab. Ad ramulos *Dorycnii germanici* (Gremli) Rouy in colle Drenin prope Crikvenicam. Sporis paulo minoribus 13 — 15,4 μ longis ac 5 — 6 μ latis, ascis 75 — 88 μ longis ac 10 — 11,5 μ latis, parte sporifera ca. 50 μ longa.

Pleospora herbarum Rbh. Ad caules:

Cardariae Drabae Crikvenicae.

Diplotaxidis tenuifoliae ibidem.

Glaucii flavi ad litora maris Adriatici ad Alexandrovo in insula Krk.

Crithmi maritimi in litore maris Crikvenicae.

Daturae Stramonii infra Therapiam Crikvenicae.

Rutae divaricatae Fen. ad Sct. Jelenam prope Crikvenicam.

Lini tenuifolii in declivitate infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones versus.

Atriplicis litoralis L. in litore maris in sinu Alejandrovo versus in insula Krk.

Pleospora media Niessl. in caulibus *Inulae crithmoidis* in sinu maris Alejandrovo versus in insula Krk.

Pleospora Salsolae Fuck. ad folia *Salsolae Kali* L. Crikvenicae. Ascis 154 — 176 μ longis ac 23 — 26 μ latis, sporis plerumque $30 \times 11 \mu$, sed etiam $34,6 \times 15,4 \mu$ usque $41 \times 19,2 \mu$, 7 saeptis praeditis et uno septo longitudinali, superiore ac inferiore parte ascorum monostichis et solum media parte ascorum binis (distichis) aureo-lutescentibus.

Pleospora Asperulae Tass. in caulibus emortuis *Asperulae cynanchicae* in declivitate infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones versus. Ascis clavato-cylindraceis 89 — 95 μ longis ac 13 μ latis, sporis infima parte monostichis, superiore parte distichis, 5 — 6 septatis, medio loculo saepissime maximo, longitudinali septo saepe non continuo et fracto. Primum sporis aureo-luteolis, deinde bruneo-luteis, 21 μ longis ac 7,5 μ latis.

Pleospora infectoria Fuck. ad culmos *Dactyridis hispanicae* L. in declivitate infra Therapiam Crikvenicae.

Gnomonia Amygdalinae Fuck. ad caules emortuos *Euphorbiae fragiferae* Jan. inter Sct. Barbaram et Sct. Florianum ad Selce.

Hypospila Pustula (Pers.) Karst. Ad folia *Quercus pubescens* ad hortos urbanos Crikvenicae.

Clypeosphaeria Asparagi (Fuck.) Wint. ad ramos siccios *Asparagi acutifolii* in litore maris ad Crikvenicam.

Dothidella Ulmi Wint. ad folia *Ulmis campestris* ad Košulandici a Crikvenica ad septentriones spectans.

Hysterographium Fraxini (Pers.) de Not. ad ramos *Olea europaea* ad hortos urbanos et ad litus maris Crikvenicae

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev. ad folia *Agropyri litoralis* in litore maris ad Crikvenicam.

Aulographum pinorum Desm. In acibus *Pini maritimae* in declivitate infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones versus.

Stegia Lauri (Caldesi) Sacc. ad folia *Laurinobilis* in hortis urbanis Crikvenicae.

Epichloë typhina (Pers.) Tul. ad culmos *Dactylidis hispaniae* ad Kačjak prope Crikvenicam.

Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc. ad folia *Medicaginis hispidae* Gärtn. ad Sct. Jelenam ad Crikvenicam.

Ad folia *Medicaginis minimae* in declivitate infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones spectans.

Pyrenopeziza radians (Rob. et. Desm.) Rehm. Ad folia caulesque *Speculariae Speculi Dubračinae fluminis* ad Crikvenicam.

Fungi imperfecti.

Phyllosticta monspessulanii Passer. in foliis *Aceris monspessulanum* ad Therapiam Crikvenicae.

Phyllosticta Nerii West. in foliis *Nerii Oleandri* Crikvenicae.

Phyllosticta Hederae Sacc. et Roum. in foliis *Hederae Helicis* in viridariis urbanis Crikvenicae.

Phoma superflua Sacc. in caulibus emortuis *Scabiosae Columbariae* ad Zoričići ad Crikvenicam.

Phoma peregrina Sacc. in caulibus emortuis *Carlinae longifoliae* ad Crikvenicam.

Phoma Genistae tinctoriae Petrak in caulibus emortuis *Genistae pulchellae* Vis. infra Therapiam ad Crikvenicam.

Phoma Smilacis Boy et Jacz. in caulibus emortuis *Smilacis asperae* ad Sct. Jelenam.

Phoma Briardiana Trotter in cecidiis *Cynipis Quercus* inter Krk oppidum et Polje.

Phoma Rusci West. una cum *Leptosphaeria Rusci* (Fr.) Sacc. ad ramos emortuos *Rusci aculeati* L. ad Šuperam prope Crikvenicam.

Phoma Salviae Brun. in caulibus emortuis *Salviae officinalis* supra coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Phoma oleracea Sacc. in caulibus emortuis *Scrophulariae caninae* in viridariis Crikvenicae et ibidem in litore maris.

Phoma oleracea Sacc. var. **Arabidis** Baudyš et Picbauer var. n.

Pycnidii sparsis, vel 2 — 4 conferte aggregatis, ca. 280 μ latis ac 330 μ longis, ostiolo protracto ac parvo praeditis, contextu pseudoparenchymatico, luteo-brunneo, circum porum obscuro.

Sporis 5 — 5,5 μ longis ac 1 — 1,5 μ latis, eorumque stipitibus 7 — 14 μ longis hyalinis.

Habitat in caulibus *Arabidis hirsuta* e mortuis ad Crikvenicam.

Phoma inulina Sacc. in caulibus *Inulae crithmoidis* L. in sinu maris Alexandrovo versus in insula Krk.

Phoma tamaricella Sacc. ad ramos e mortuos *Tamaricis africanae* Prir. in insula Košljun.

Phoma Lini Pass. ad caules e mortuos *Lini tenuifolii* in declivitate infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones versus.

Phoma Viticis Celotti ad ramulos e mortuos *Viticis Agni casti* in litore maris ad Crikvenicam.

Ascochyta graminicola Sacc. ad folia *Bromi hordeacei* L. ad Šuperam prope Crikvenicam.

Diplodina Datura Kab. et Bub. ad caules e mortuos *Datura Stramonii* ad Therapiam Crikvenicarum.

Darluca filum (Bivona) Castagne ad folia *Bromi erecti* Huds. infra Therapiam Crikvenicarum.

Septoria Koeleriae Cocc. et Morr. ad folia languida *Koeleriae phleoidis* (Vill.) Pers. infra Therapiam Crikvenicarum.

Septoria phleina Baudyš et Picbauer in Fungi novi vel minus cogniti, pars III, ad folia languida *Phlei arenarii* L. in litore maris infra Therapiam Crikvenicarum.

Maculis pallidis majorem partem foliorum occupantibus; peritheciis sparsis, seriatim dispositis, saccatim immersis, obscure fuscis, globosis vel ellipticis, magno ostiolo praeditis, 70 — 100 μ diam., contextu dilute-fuscescenti.

Sporis compacte egredientibus, filiformibus, rectis, 24 — 39 μ longis, 1 μ latis, inferiore parte aperte uniseptatis.

Septoria Passerinii Sacc. ad folia languida *Hordei murini* in litore maris Crikvenicarum.

Ad folia *Hordei leporini* Lk. ad Šuperam prope Crikvenicam.

Septoria Caricis Passer. ad folia emortua *Caricis* divisae infra Therapiam Crikvenicae.

Septoria Clematidis Flammulae Roum. in foliis *Clematis* *Flammulae* ad Šuperam pr. Crikvenicam.

Septoria Cerastii Rob. et Desm. ad folia *Cerastii viscosi* L. in convalli Dubračinae fluminis ad Crikvenicam.

Ad folia *Cerastii taurici* Sp. ad Šuperam prope Crikvenicam.

Septoria Stellariae Rob. et Desm. ad folia *Stellariae apetala* e ad Šuperam.

Septoria Emeri Sacc. In foliis *Coronillae* sp. ad Therapiam Crikvenicae.

Rhabdospora Thümeniana (Pass.) Sacc. ad caules emortuos *Euphorbiae exiguae* ad Novi Vinodolski prope Crikvenicam.

Placosphaeria Coronillae Sacc. ad folia caulesque *Coronillae scorpioidis* (L.) Koch. in declivitate infra Therapiam Crikvenicae.

Cytospora Rhois Fr. ad ramos emortuos *Rhus typhinae* ad Šuperam prope Crikvenicam.

Cytospora carphosperma Fr. ad ramos emortuos *Tiliae cordatae* Crikvenicae.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc. Ad folia *Yuccae gloriosae* in hortis urbanis Crikvenicae.

Coniothyrium syconophilum Schulzer et Sacc. ad ramos emortuos *Fici caricae* L. in viridariis Crikvenicae.

Diplodia inquinans West. ad ramos *Fraxini Orni* in convalli Dubračinae fluminis infra Badanje a Crikvenica ad septentriones versus.

Diplodia Pistaciae Berl. et Bres. ad ramos emortuos *Pistaciae Terebinthi* in convalli Dubračinae fluminis ad Crikvenicam.

Diplodia croatica Baudyš et Picbauer.

Pycnidii immersis, solum parte superiore emersis.

Sporis cylindraceo-ovoideis, utrinque rotundatis, fuscis, medio septo praeditis, ad septum non constrictis 7 — 8 μ longis, ac 3,5 — 4 μ latis, unicellularibus luteo-fuscis ac paulo minoribus.

Habitat ad ramulos *Dorycnii germanici* (Greml) Rouy in colle Drenin ad Crikvenicam.

Diplodia Yuccae Speg. Ad folia *Yuccae gloriosae* in hortis urbanis Crikvenicae.

Microdiplodia perpusilla (Desm.) Allesch. ad caules Foeniculi vulgaris ad Sct. Jelenam.

Hendersonia sarmentorum West. ad ramulos emortuos Laurinobilis in viridariis Crikvenicae.

Hendersonia Convolvuli Baudyš et Picbauer sp. n. Pycnidii innatis, subglobosis, ostiolo paulum protracto paulum emersis, contextu parenchymatico brunneo-luteo, ca. 80 μ diam.

Sporidiis protracte fusiformibus, media parte latissimis, utrinque attenuatis atque rotundato-acututatis, brunneolo-luteis, loculis finitis paulum dilutioribus, septem-septatis, ad septa non constrictis, 26 — 30 μ longis ac 5 — 5,5 μ latis.

Habitat ad caules Convolvuli tenuissimi ad Zoriciči prope Crikvenicam.

Ab *Hendersonia Letendreana* Sacc. sporidiis latioribus ac numero septorum differt; *Hendersoniae pulchellae* Sacc. propinqua variatioque eae putari posset, sed constanti numero septorum (7) atque sporidiis paulo minoribus differenda.

Hendersonia Baudyši Picbauer. Pycnidii immersis globosis vel paulum protracte-globosis, poro atro prominulis et epidermide translucentibus, contextu luteolo usque fuscamente-luteolo, poro ca. 8 μ lato apertis et circum porum obscure coronatis.

Sporidiis cylindraceis, saepe uno fine claviformiter crassioribus, utrinque rotundatis, fuscamente-luteolis, constanter tri-septatis, ad septa non vel paulum constrictis, 18 — 23 μ longis et 3 — 3,5 μ latis. Sporidiis nondum bene evolutis minoribus, aseptatis, 11 μ longis.

Habitat in culmis foliisque *Cynodontis Dactyli* Pers. infra Therapiam Crikvenicae Croatiae.

Propinqua *Hendersoniae crastophilae* Sacc. var. *Cynodontis Dactyli* Sacc. sed sporulis brevioribus ac numero septorum differt. Puto var. *Cynodontis Dactyli* Sacc. variationem speciei nostrae censere melius esse.

Camarosporium aequivocum (Pass.) Sacc. ad caules emortuos Artemisiae Lobelii All. supra coloniam liberorum bohemicam Crikvenicae.

Camarosporium Coronillae Sacc. et Speg. var. *Coluteae* Sacc. ad ramos Coluteae arborecentis Crikvenicae.

Dinemasporium strigosum (Fr.) Sacc. in follis culmisque *Cynodontis Dactyli* infra Therapiam Crikvenicae.

Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc. ad ramos Rhus typhinae Šuperae et Crikvenicae.

Gloeosporium arvense Sacc. et Penz. in foliis *Veronicae politae* ad Zoričići prope Crikvenicam.

Pestalozzia Osyridis Thüm. In ramulis siccis *Osyridis albæ* ad coloniam liberorum Crikvenicæ.

Fusidium griseum Link. ad folia *Aceris monspessulanæ* ad stationem viae ferreae in Plasi.

Oidium erysiphoides Fr. ad folia *Crepidis virentis* ad Kamenište ab oppido Krk ad orientem versus.

Ad folia *Hippocrepidis comosae* ad Kamenište ab oppido Krk ad orientem versus.

Oïtium Evonymi japonicae Arcang. ad folia *Evonymi japonicae* in viridariis Crikvenicæ.

Oidium Oxalidis Mc. Alp. ad folia *Oxalidis corniculatae* ad portum Sct. Jelenæ ad Crikvenicam.

Oidium quercinum Thüm. ad folia *Quercus pubescens* inter Grižane et Bribir.

Didymopsis Helvellaæ (Corda) Sacc. et March. Ad corpora *Pustulariae coronariae* in silva supra coloniam bohemicam ad Crikvenicam.

Ramularia Parietariae Pass. ad folia *Parietariae ramiflorae* ad Šuperam.

Ramularia Veronicae Fuck. ad folia *Veronicae politae* Fr. ad viridaria urbana Crikvenicæ.

Ramularia Prismatocarpi Oud. Ad folia *Speculariae Speculi* ad Šuperam pr. Crikvenicam.

Coniosporium gramineum (Ell. et Everh.) Sacc. ad folia culmosque *Agropyri litoralis* in litore maris Crikvenicæ.

Fusicladium deprecsum (Berk. et Br.) Sacc. ad folia *Foeniculi vulgaris* ad viridaria urbana Crikvenicæ.

Scolicotrichum graminis Fuck. Ad folia *Scleropoa erigidae* (L.) Gris. ad coloniam liberorum Crikvenicæ.

Scolicotrichum Fraxini Passer. ad folia *Fraxini Orni* ad Šuperam.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. ad scapos emortuos *Yuccæ gloriose* infra Therapiam Crikvenicæ.

Polythrincium Trifolii Kunze ad folia *Trifolii scabri* L. ad Šuperam.

Helminthosporium gracile Sacc. in foliis *Iridis germanicae* in viridariis Crikvenicæ.

Cercospora smilacina Sacc. ad folia *Smilacis asperae* in litore maris Crikvenicæ.

Cercospora Rautensis Mass.? ad folia *Coronillae scorpioidis* (L.) Koch ad viridaria urbana Crikvenicae.

Inopia literarum integre identificare non potui.

Macrosporium commune Rbh. ad scapos emortuos *Yuccae gloriosae* infra Therapiam Crikvenicae.

Mystrosporium pyriforme Desm. ad caules emortuos *Eryngii amethystini* in declivitate infra Therapiam Crikvenicae.

Alternaria tenuis Nees. ad caules *Daturae Stramonii* ad Therapiam pr. Crikvenicam.

Vermicularia Eryngii Desm. ad caules *Eryngii amethystini* ad Therapiam Crikvenicae.

Fusarium roseum Link. ad caules emortuos *Zeae Maydis* ad Crikvenicam.

Vermicularia dematium (Pers.) Fr. ad caules *Clematidis Flammulae* in convalli Dubračinae fluminis infra Badanj a Crikvenica ad septentriones versus.

Vermicularia affinis Sacc. et Briard ad folia *Sesleriae autumnalis* (Scop.) Schultze in declivitate calcarea infra Sopaljsko a Crikvenica ad septentriones versus.

Vermicularia culmigena Desm. ad folia vaginasque *Agropyri litoralis* (Host.) Dum. in litore maris in Zelenkaja propius Crikvenicam.

Vermicularia herbarum West. Ad folia *Yuccae gloriosa* e Crikvenicae.

(Ex Instituto Agronomico Brunae. Brno).